

C H A P I T R E

4

ANATOMIE


GLOBALE

VISUALISATION

Cours modifié : conservation des seuls aspects massage et orthopédie

PREMIER EXAMEN

IL FAUT L'EFFECTUER DANS LES 2 PREMIERES MINUTES QUAND LE MALADE SE COUCHE CAR N'ETANT PLUS EN ACTION LES MUSCLES SE DETENDENT ET MEME LE BASSIN S'OUVRE... FAUSSANT LES RENSEIGNEMENTS.



VOILA PROBABLEMENT UNE AFFAIRE VERTEBRALE D'INEGALITE DUE A UN DISQUE PINCE. EN EFFET SAUF FRACTURE OU MALADIE LES MEMBRES INFERIEURS SONT STATISTIQUEMENT ASSEZ DE LA MEME LONGUEUR.

CES DIFFERENCES DE HAUTEUR DES GENOUX AVEC TOUS LES CAS DE FIGURE ASSOCIES PARFOIS DONT LE CAS AU-DESSUS, RESTENT CEPENDANT LIES A LA LUXATION DE L'ARTICULATION SACRO-ILIAQUE.


ON PEUT TRES BIEN PRESENTER LA JAMBE GAUCHE PLUS COURTE ET DANS CETTE POSITION LE GENOU GAUCHE PLUS HAUT.


PARFOIS LES COMPENSATIONS S'ANNIHILENT.

ON NE VOIT RIEN D'APPARENT MAIS L'AFFECTION EST DOUBLE;

PARFOIS UN BASSIN EURASE PAR 2 LUXATIONS DES 2 SACRO-ILIAQUES;

EN CE CAS LE DIAMETRE MAXIMUM DES HANCHES A BAISSE DE NIVEAU ET LE BOURRELET DU TROCHANTER FAIT APPARAITRE LA CULOTTE DE CHEVAL.





CE SUJET EST COUCHE SUR
LE DOS GENOU PLIE ET
CUISSSE FEMUR A 90 °

CE GENOU QUI DEPASSE
L'AUTRE, DONC CETTE
CUISSSE QUI PARAIT PLUS
LONGUE S'EXPLIQUE DANS
L'AFFECTION SACRO ILIAQUE
UNILATERALE OU L'UNE DES
HELICES DU BASSIN
PROJETTE L'UN DES OS
ILIAQUES EN AVANT.

ET MEME LORSQU'ON MESURE
LES JAMBES, ON PEUT
S'APERCEVOIR QUE CE GENOU
EN AVANT APPARTIENT PARFOIS
A UNE JAMBE PLUS COURTE QUAND
ON COMPARE COMME IL EST
DESSINE PLUS LOIN, LES DEUX
EPINES TIBIALES INFERIEURES
DANS CE CAS-LA, L'AFFECTION
N'EST QU'UNE RESULTANTE.
IL FAUT SOIGNER LA SACRO-ILIAQUE
AVANT LE GENOU.